



## 동전마름병 발생과 방제

### ❖ 동전마름병 증상

- 이른 아침에 균사 형성
- 균사 생긴 곳에 모두 발병하는 것은 아님
- 15℃~30℃의 온도가 지속되고 습도가 높은 경우 발병



동전마름병 균사

### ❖ 발병이유

- 벤트 그린의 예고가 낮고, 질소질 부족
- 건조한 샌드그린
- 신품종 도입에 의한 감수성 증가
- 대취의 축적 빠름
- 티, 카라, 페어웨이의 매트화
- 대취층에 의한 약제의 흡착



동전마름병 증상

### ❖ 경종적 방제

- 이슬이 묻어 있는 기간을 줄인다.
- 야간살수는 금지하고 새벽 살수를 실시
- 적정 질소 시비량 유지
- 배토하거나 버티컷을 통한 대취 제거, 정기적인 예지물 제거
- 저항성 품종 사용

### ❖ 약제방제

- 예방살포, 발병시 즉시 살포
- 앞에 발병되므로 적은 물량(50~100ml/m<sup>2</sup>)살포
- 매트화 되어 있는 곳은 살포 물량을 늘여 처리
- 관리기계에 의한 확산 가능하므로 넓은 면적 살포
- 계통이 다른 약제 교호살포
- 가을 처리로 이듬해 병 발생 감소
- 유사한 병 증상으로 인한 약제 선정 주의

### 적용 약제





# 동전마름병과 혼동하기 쉬운 병해 및 구별법

