

검 사 필 증
신 젠 타

- 사용 전에 라벨을 잘 읽을 것 ○ 라벨 표시사항 이외에는 사용하지 말 것
- 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것

저독성
어독성 II 급

농 약
살균제

등록번호: 2-살균-30



적용병해충 및 사용량

작물명	적용병해	사용적기	물20ℓ당 사용약량
장미	잣빛곰팡이병	발병초 7일간격	4g
거베라			
잔디	라이족토니아마름병	발병초 7일간격 관주처리(1ℓ/㎡)	

성 분 (품목명: 플루디옥소닐 수화제)

유효성분: fludioxonil 48.5%
기 타: 계면활성제, 접착제, 충전제, 증량제 51.5%

※ 특징, 사용방법, 안전 및 기타 주의사항, 약효·약해 주의사항, 해독방법, 취급제한기준은 제품 뒷면 표기

® 또는 ™ 으로 표기된 제품명, 신젠타 로고 및 CP 프레임은 신젠타 그룹 컴퍼니의 상표들임

100g



자르는곳 ➡

특징

1. 이 약액은 시아노피롤계 계통의 살균제입니다.
2. 이 약액은 균사 및 분생포자의 성장 및 발아를 억제합니다.

사용방법

1. 이 약제를 연속하여 사용하면 저항성이 생길 수 있으니 다른 계통의 약제와 바뀌가며 사용하십시오.
2. 이 약액은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 작물에 충분히 묻도록 뿌리십시오. 잔디에 사용할 경우 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기의 노즐을 빼거나 물뿌리개를 이용하여 ㎡당 1ℓ 를 잔디가 충분히 젖도록 관주하십시오.
3. 라벨의 표기사항이 이해가 되지 않거나 의문사항 있을 경우에는 신젠타코리아(주)에 문의하십시오.

⚠ 안전 및 기타 주의사항

1. 약을 뿌릴 때에는 바람을 등지고 뿌리시되 마스크, 고무장갑 및 방제복 등을 반드시 착용하여야 하며 작업후에는 입안을물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
2. 붓지를 뜯을 때 신체(눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
3. 농약살포시 주변 작물 및 인가등으로 바람에 날려들어가지 않도록 주의하십시오.
4. 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
5. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
6. 신체에 이상(감기, 알레르기, 임신, 천식, 피부병 등)이 있을때는 약제 살포 및 취급을 금합니다.
7. 이 약액은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.

⚠ 약효·약해 주의사항

1. 이 약액을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 신젠타코리아(주)에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
 2. 살포전·후 살포기를 반드시 씻으십시오.
- ※ 적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

해독방법

1. 중독 증상이 있을 때에는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오.
 2. 잘못하여 먹었을 때에는 바로 소금물을 먹여 토하게 하고 의사의 치료를 받으십시오.
 3. 만일 약액이 눈에 들어갔을 때에는 즉시 흐르는 물로 10~15분간 깨끗이 씻어내고 안과의사의 치료를 받으십시오.
- 사용한 빈 농약용기를 마을 수집장에 모아두면 농협 또는 한국환경자원공사에서 수거하고 있습니다.
(한국환경자원공사에서 현금 지급함)
○ 기타 자세한 사항은 농촌지도기관에 문의하십시오.

⚠ 취급제한기준

살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러들어갈 우려가 있는 지역에서는 일시에 광범위하게 사용하지 마십시오.

Ⓢ 이 농약은 의약품·식품 또는 사료의 보관장소와 구분하여 보관하십시오.



약효보증기간:

까지

수입모집단번호:

수입원:
신젠타 코리아(주)
서울특별시 종로구 공평동 100번지 Tel: 1588-3889
제조원: 신젠타 (미국)