

검 사 필 증
신 센 타

저독성

농 약
제초제

등록번호: 2-제초-33

- 사용 전에 라벨을 잘 읽을 것 ○ 라벨 표시사항 이외에는 사용하지 말 것
- 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것



모뉴먼트[®] 입상수화제

적용대상 및 사용량

작물명	적용장소	사용예기	1,000㎡(10a당 사용량)	
			약량	상량량
한국전지	일년생 및 다년생 잡초	잡초 생육 초기 (비행이 3월기 이내)	8g	150~200g

특징

- 이 농약은 잡초생육초기에 처리하는 경엽처리형 제초제입니다. 잡초발생전에 처리하여도 잡초발생을 억제시키지 못하며, 잡초의 초장이 10cm이내일 때 처리하는 것이 잡초방제에 더욱 효과적입니다.
- 이 농약은 약효 지속기간이 매우 길어 장기간 잡초발생을 효과적으로 억제하여 줍니다.
- 이 농약은 일년생 화분과 및 광합성소 분해 인자와 보호물, 항파사 등 다년생잡초의 묘아를 등 월년생잡초도 효과적으로 방제합니다.

해독방법

- 중독 증상이 있을 때에는 즉시 전문을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오.
- 중독하여 마셨을 때에는 바로 소금물을 먹어 토하게 하고 의사의 치료를 받으십시오.
- 민약 약액이 눈에 들어갔을 때에는 즉시 흐르는 물로 10~15분 깨끗이 씻어내고 안과에서의 치료를 받으십시오.

⚠️ 취급방법

- 이 농약은 **위약물·시료물 또는 시료의 보관장소와 구분하여 보관**하십시오.

성 분

(총액량: **프린타리시날푸름**을 입상수화제)
 유효성분: trifluralin(트리플루랄린)-sodium 72.5%
 기타: 계면활성제, 보조제, 용매제 27.5%

☞ 또는 ㉞으로 표기된 제품명, 신센타 로고 및 CP 프레이밍을 신센타 그룹 컴퍼니의 상표물임

20g



- 사용된 농 약 용기를 미흡 소모에 도달하면 농약 또는 한국환경재단에서 수거하고 있습니다. (한국환경재단에서 현금 지급)
- 기타 자세한 사항은 농약종지도기에 문의 하십시오.

자 르 는 곳 ➡

사용방법

- 이 농약은 사용량을 지켜 물에 희석한 후 분무기를 이용하여 잡초에 충분히 분무해 주십시오.
- 이 농약은 경엽처리효과 뿐만 아니라 표피침투효과도 높고 잡초를 사멸해 고사시기가 약초기간이 길어 보충의 경우 1년에 2회(최종생육시기)만 처리하면 잔디밭 잡초를 효율적으로 방제할 수 있습니다. (봄, 여름)
- 비행이 많은 경우: 비행이 2.5~3.0m 정도 저상을 때 뿌려주십시오.
- 광합성소 발생이 많은 경우: 다년생을 포함하여 광합성초 5cm정도 저상을 때 뿌려주십시오.
- 표피가 등 유효성-시류 건조할 때 많은 경우: 항공사나-과 일종과 4~5m 정도 저상을 때 뿌려주십시오. (이후)
- 세토아를 생육초기부터 개화하기까지 어느 때나 방제가 가능합니다.
- 다 다른 잡초와 세토아를 동시에 방제하고자 하는 경우에는 사용법이 거의 다 발생한 시기에 약제를 살포하십시오. (이후)의 표시사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신센타코리아(주)에 문의하십시오.

⚠️ 약효·약해 주의사항

- 이 농약은 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 선택과리아(중)에서 제공한 농약혼용기부표를 확인하여야 하며, 혼용 불가능하거나 혼용기부표에 있는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
- 이 농약은 잔디밭이 완전히 조성된 후입니다. 글친디 등 난지형 잔디에만 안전합니다. 새풀이 피복중이거나, 맞잡을 때어난 잔디밭 등에는 사용하지 마십시오
- 이 농약은 벼,오리쌀, 물부스쌀, 라이그라스, 라이그라스 등 한지형잔디에는 심한 약해가 있으므로 약액이 한지형잔디로 흘러가거나 흘러 들어갈 우려가 있을 당시지 때에는 사용하지 마십시오
- 이 약제는 호형에서 처리되었을 경우 약해 등 문제가 있으나 약액이 비산되어 주위 작물이나 잔치형 잔디, 화초류, 수목의 잎에 묻으면 낙엽, 가지선단 등과 동 약해가 발생할 수 있으나 약액이 비산되지 않도록 주의하여 주십시오
- 약제처리 24시간 이내 강우가 예상될 때는 약제처리를 피하여 주십시오
- 약제 살포 후 살포기, 작업지 등 큰 공작물 치는 사람들에 의해 약제가 사당잔디에 접촉될 경우 약제가 나뉘날 우려가 있으므로 주의하십시오
- 한지형 잔디에 직접 또는 그 인접지역의 한지형잔디로부터 약 20m이내에 처리하지 마십시오. 약제 처리 후 비온 상태라도 이틀 이상, 강우, 강수 등에 의하여 용출된 약제가 작업기, 작업차, 공작물 치는 사람 등을 통하여 잔디에 잔디에 접촉될 경우 약제가 나뉘날 수 있습니다.
- 이 약제는 서해의 직방하는 특성이 있어 잡초를 완전히 고사시키는데 불, 여름치러는 30일, 가을치러는 60일 정도가 소요됩니다.
- 이 약제를 처리한 후 다른 농약을 재처리할 생육이 억제되거나 고사되는 약해가 발생할 수 있으나 약제처리 후 1년 동안 다른 작 물을 피복하거나 잡작하지 마십시오
- 잔디의 생육이 불량한 경우나 한여름과 고온기에는 생육이 억제되거나 잔디알갱이 황변되는 약해가 발생할 우려가 있으므로 주의하십시오
1. 약제살포 후 30일 이내 해당 예방할 경우 잡초발생 효과가 떨어질 수 있으나 약제처리 후 3월 이후에 잔디를 예방하십시오.
2. 비행이, 가지치기, 피 등 유선성 화분과와 약, 토끼풀, 항파사 등 다년생 잡초, 황풍사나, 피라디 등 사초과 잡초, 세토아를 등에는 효과가 우수하여 까마귀, 큰만발알, 시양만발알, 닭의장풀, 쇠비름, 제비꽃, 미늘, 쇠뜨기, 옥수수 등은 효과가 떨어집니다.
3. 약제를 살포할 때 잔치형 잔디에 약액이 잡초의 근줄기에 부착되어 효과가 더욱 안정적으로 나타납니다.

※ 약제 살포량과 잡초 이외에는 사용하지 마십시오.

⚠️ 안전 및 기타 주의사항



1. 약을 부릴 때에는 바람을 등지고 뿌리고자 마시고, 고무장갑 및 방목복을 반드시 착용하여야 하며 작업후에는 입안물을 물로 씻고 손, 발, 얼굴 등을 깨끗이 씻으십시오
2. 무릎을 꿇 때 신발(눈, 크, 입, 피부 등에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오)
3. 약제를 분쇄할 때는 작은 용기에 충분히 녹인 후 살포기에 투입하여 주십시오.
4. 사용 후 유수 희석액과 살포기를 씻은 후에는 반드시 물에 충분히 세척하여야 합니다. (잔디에 묻지 않도록 주의하십시오)
5. 신체가 이상(간지, 알레르기, 임신, 의사, 피부병 등)이 있을 때는 약제 살포 및 취급을 금합니다.
6. 이 농약은 잘 말렸을 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
7. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
8. 농약 살포 전 후에는 살포기(무릎, 바퀴, 노즐, 약통, 액대 등)을 반드시 세척하십시오.
9. 약제 살포기를 씻을 때는 약통의 안쪽 외부부분을 포함하여 내부를 깨끗이 씻으십시오. 약제 탱크에 깨끗한 물을 가득 채운 후 탱크를 가동시켜 충분히 순환시킨 후 이 물의 반은 배수관을 통하여 빼내고 나머지 반은 노즐을 통해 분무하여 배수하십시오. 이 과정을 3회 이상 수행하십시오.



약효보증기간 :

까지

수입모집번호 :

수입원: 신센타 코리아(주)
 서울특별시 동부구 주동로 109번지 Tel:1588-3888
 제조원: 신센타 (프랑스)