

# 143ml

# 살균제

### ⚠ 안전 및 기타 주의사항

- 1. 약을 뿌릴 때에는 바람을 등지고 뿌리시되 마스크, 고무장갑 및 방제복 등을 반드시 착용하여야 하며 작업후에는 입안을 물로 헹구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 깨끗이 씻으십시오.
- 2. 병 뚜껑을 열때 신체 (눈, 코, 입, 피부 등)에 내용물이 묻지 않도록 주의하십시오.
- 3. 사용 후 남은 희석액과 살포기를 씻은 물은 하천 등에 흘러들어가지 않도록 안전하게 처리하십시오.
- 4. 신체에 이상(갑자, 알레르기, 임산, 천식, 피부병 등)이 있을때는 약제 살포 및 취급을 금합니다.
- 5. 본 제품은 농약이므로 다른 용기에 옮겨 보관하지 마십시오.
- 6. 이 농약은 잘 밀봉한 뒤 햇빛을 피하여 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.

### ⚠ 약효 · 약해 주의사항

- 1. 이 농약을 섞어 뿌리고자 할 때에는 반드시 당해년도에 신젠타코리아(주)에서 제공한 농약혼용가부표를 확인하여야 하며, 혼용이 불가능하거나 혼용가부표에 없는 경우에는 절대로 섞어 뿌리지 마십시오.
- 2. 이 농약을 살포하기 전 · 후에는 살포기구 및 살포탱크 등을 반드시 깨끗이 씻으십시오.
- 3. 이 농약을 살포 했던 살포기구 및 살포탱크 등을 이용하여 다른 농약을 살포할 경우 사과나무에는 절대로 사용하지 마십시오. 특히, 이 농약의 살포액이 바람에 날려 인근 사과밭에 비산될 경우 품종 특유의 약해가 발생하므로 비산 등에 의해 살포액이 사과밭에 날려 가지 않도록 충분히 주의해 주십시오.
- 5. 한국잔디에만 사용하고 서양잔디에는 약해가 있으므로 약액이 서양잔디로 흘러들어갈 우려가 있는 곳에는 사용하지 마십시오.
- 6. 잔디의 생육이 불량하거나 고온기에 살포할 경우 약해가 우려되므로 사용하지 마십시오.

※적용대상 작물과 병해충 이외에는 사용하지 마십시오.

### 사용방법

- 1. 이 농약은 액상수화제이므로 사용전에 잘 흔들어 내용물이 잘 섞이도록 하십시오.
- 2. 이 약제를 연속하여 사용하면 저항성이 생길수 있으니 다른 계통의 약제와 바꿔가며 사용하십시오.
- 3. 이 농약은 사용약량을 지켜 물에 희석한 후 분무기의 노즐을 빼거나 물뿌리개를 이용하여 m당 1ℓ를 잔디가 충분히 젖도록 관주 하십시오.
- 4. 라벨의 표기사항이 이해가 되지 않거나 의문사항이 있을 경우에는 신젠타코리아(주)에 문의 하십시오.

### 해독방법

- 1. 중독 증상이 있을 때에는 즉시 작업을 중지하고 안정을 취할 것이며 의사의 지시를 받으십시오.
- 2. 잘못하여 마셨을 때에는 바로 소금물을 먹여 토하게 하고 역사의 치료를 받으십시오.
- 3. 만일 약액이 눈에 들어갔을 때에는 즉시 흐르는 물로 10~15분간 깨끗이 씻어내고 안과외사의 치료를 받으십시오.
- 사용한 빈 농약용기를 마을 수질정에서 모아두면 농염 또는 한국환경자원공사에서 수거하고 있습니다. (한국환경자원공사에서 현금 지급함)
- 기타 자세한 사항은 농촌지도기관에 문의하십시오.

**성분 (품목명: 아족시스트로빈 · 사이프로코나졸 액상수화제)**  
 유효성분: azoxystrobin ..... 17.3%  
 cyproconazole ..... 6.7%  
 기타 계면활성제, 증점제, 소포제, 방부제, 증량제 ..... 76.0%

**보통독성  
어독성II급**      **농약**      **살균제**      등록번호:2-살균-31

○ 사용 전에 라벨을 잘 읽을 것  
○ 라벨 표시사항 이외에는 사용하지 말 것  
○ 어린이 손이 닿는 곳에 놓거나 보관하지 말 것



**하운드** 액상수화제

Ⓢ 또는 ™ 으로 표기된 제품명, 신젠타 로고 및 CP 프레이밍은 신젠타 그룹 컴퍼니의 상표들임

**143 ml**      **syngenta**

### 적용병해충 및 사용량

○병뚜껑의 용량: 약20ml

작물명	적용병해	사용적기	물 20ℓ당 사용약량
한국잔디	라이족토니아마름병	발병초 7일 간격 관주처리 (1ℓ / m <sup>2</sup> )	2.86ml

### 특징

- 1. 이 농약은 스트로빌루린계인 아족시스트로빈과 트리azole계인 사이프로코나졸의 합제입니다.
- 2. 이 농약은 작용제로 침투하여 작물체 전체에 골고루 분포하여 효과가 빠르고 고르게 나타납니다.
- 3. 이 농약은 포자발아억제, 흡기형성저해, 군사생장저지, 포자생성저해 작용으로 예방, 치료 효과를 가지고 있으며 병원균의 2차감염을 예방합니다.

### ⚠ 취급제한기준

살포된 농약이 양어장, 저수지, 상수취수원, 해역 등으로 바람에 날려 들어가거나 빗물에 씻겨 직접 흘러들어갈 우려가 있는 지역에서는 일시에 광범위하게 사용하지 마십시오.

○ 이 농약은 의약품 · 식약품 또는 사료의 보관장소와 구분하여 보관 하십시오.

약효보 증 권 기 :

수입모집단 번 호 :

까지 수입원: **신젠타 코리아(주)**  
 서울특별시 종로구 공평동 100번지 Tel:1588-3889  
 제조원: 신젠타(영국)

